

# VitaCorrect™ Dual Calcium

... Kalciji slaucamām govīm



## Piena trieka (Hipokalcēmija)

Piena trieka ir vecāku govju problēma, visbiežāk pēc 3. dzemdībām. Atnešanās laikā, kad tesmenis piepildās ar jaunpienu, strauji palielinās kalcija vajadzība organismā.

Kalcija joni nepieciešami arī muskuļu darba nodrošināšanai. Kad Ca līmenis asinīs krītas, kāju muskulatūras tonuss pazeminās, dzīvnieks nespēj nostāvēt un apguļas.

Govij, kurai ir piena trieka, pastāv lielāka iespēja iegūt dažāda rakstura traumas un saslimt ar mastītu (ilgstošs tesmeņa kontakts ar pakaišiem).

Ar klīnisku piena trieku saslimst 5-9% govju. Svarīgi zināt, ka pastāv arī subklīniska piena trieka un tai pakļauti 3-5 reizes vairāk dzīvnieku... Tātad, uz katru klīniski slimu dzīvnieku, ganāmpulkā eksistē 3-5 slēpti slimas govīs.

Klīniska piena trieka „izmaksā” aptuveni 250 Ls... Nav apstrīdams, ka klīniskas un subklīniskas piena triekas profilaksei ir pārliecinoši ekonomiski aspekti...

Profilakse vienmēr ir izdevīgāka un efektīvāka par ārstēšanu!

## Piena triekas ārstēšana

Piena triekas ārstēšana vienmēr ir neatliekama. Standarta ārstēšana ietver sevī kalcija sāļu ievadīšanu vēnā (lēni!). Izveseļošanās notiek strauji, un dzīvnieks drīz vien pieceļas kājās. Nedrīkst aizmirst, ka pēc injekcijas ir nepieciešama uzturošā vai atbalsta terapija t.i kalcija piedevu lietošana orāli. Ja to nedara, aptuveni 1/3 slimu dzīvnieku ir nepieciešama atkārtota kalcija ievadīšana vēnā. Divkārtša kalcija lietošana, ar 8-12 stundu intervālu pēc intravenozās injekcijas, samazina piena triekas recidīvu no 30% uz 5%. Kādus kalcija sāļus izmantot? Kalcija hlorīds uzsūcas ātri, tomēr kairinoši ietekmē mutes un gremošanas trakta gļotādu (rada apdegumus!). Kalcija propionāts uzsūcas lēnāk, tai pat laikā noder arī par papildus enerģijas avotu organismam, ir saudzējošs gļotādām.

## VitaCorrect Dual Calcium kā atbalsta terapija

1 tūba VitaCorrect Dual Calcium 3-5 stundas pēc kalcija ievadīšanas vēnā.

8-12 stundas vēlāk lieto otro tūbu.

## VitaCorrect Dual Calcium kā profilakses līdzeklis

1 tūba VitaCorrect Dual Calcium līdzko novēro pirmās dzemdību pazīmes (t.i. 2-6 stundas pirms atnešanās). Otru tūbu lieto 6-10 stundas pēc atnešanās.

VitaCorrect™ Dual Calcium





Ar piena trieku slima gov. Tipiska poza.



Pastu ievada gotīnai  
iespējami dziļi mutē